

Verhalten bei Therapie mit Antikoagulantien

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen ist eine Untersuchung geplant in deren Vorfeld Ihre blutverdünnende Therapie pausiert werden muss. Dies ist notwendig, damit im Rahmen des Eingriffes Proben entnommen, Polypen entfernt oder Gewebe aus einem Organ gewonnen werden können.

Hierzu sind einige Regeln zu befolgen.

1. Bitte bringen Sie Ihren Marcumarausweis mit
2. die Gerinnungswerte (Quick / INR) müssen dokumentiert sein

Für die Untersuchung sind folgende Werte notwendig

QUICK: > 50 %
INR: < 1,7

Nur in diesem Fall sind Probenentnahme und Polypenentfernung möglich.

Hierzu sollte die Marcumartherapie 1 Woche vor der Untersuchung beendet werden, Sollte Ihnen bekannt sein, dass die Werte nur sehr langsam ansteigen ggfs. auch schon früher. Um einen weiteren Schutz trotz pausierter Marcumartherapie zu gewährleisten werden Sie in den meisten Fällen überbrückend eine sog. Heparintherapie erhalten („Bauchspritze“). Bitte beachten Sie.

Bei **einmaligem** Spritzen / Tag: am Untersuchungstag **NICHT** spritzen

Bei **zweimaligem** Spritzen / Tag: am Vorabend der Untersuchung und am Untersuchungstag **NICHT** Spritzen

Bitte beachten Sie

Untersuchungstermin am: _____

Marcumar Pause ab: _____

„Bauchspritze“ ab: _____

Kontrolle Quick / INR: _____

Aufklärung erfolgt: _____

Arzt: _____

Patient: _____

Ihr PraxisZentrum

PraxisZentrum für Gastroenterologie und Endoskopie

Dr. med. Axel Naumann · Dr. med. Alexandra Hülsdonk

Krefelder Strasse 82a · 41539 **Dormagen**
T 02133.778 06 30 · dormagen@naumann-huelsdonk.de
www.naumann-huelsdonk.de

Dr. med. Axel Naumann · Dr. med Christian Stolte

von-Werth-Strasse 5 · 41515 **Grevenbroich**
T 02181.475 93 0 · grevenbroich@naumann-huelsdonk.de
www.naumann-huelsdonk.de