

Spanish 2L prep



Instrucciones para la colonoscopia para la preparación 3L

Cinco (5) días antes:

Dejar de tomar hierro, aceite de pescado, vitamina E

Dejar de comer todas las semillas, nueces, palomitas

Aceptar tomar cualquier otro medicamento regular

* Si usted toma cualquier medicación anticoagulante, tal como Coumadin, Pradaxa, Eliquis, Plavix, Savaysa, entre otros, su médico de prescripción será contactado por nuestra oficina, y nosotros nos pondremos en contacto con usted con cualquier instrucción especial. Si usted no ha escuchado de nuestra oficina dentro de una semana de su procedimiento, llame a la línea de enfermeras de CGA al 434-817-8484 ext. 3

Día antes del procedimiento:

Líquidos claros dieta todo el día para el desayuno, el almuerzo y la cena. Los líquidos claros incluyen; Manzana/zumo de uva blanco, Sprite, Gatorade, caldo de pollo, gelatina (sin colorante rojo, azul o púrpura), café negro (sin leche ni nata) y té. NO hay alimentos sólidos!!!!

Mañana: Añada agua fría a la jarra de preparación del intestino y refrigere.

12:00 PM tome las cuatro (4) tabletas de biscacodyl 5mg. La diarrea puede comenzar dentro de 1-2 horas.

4:00 PM beba ocho (4) vasos de 8 onzas de la preparación, una cada 15-20 minutos. Almacene el resto en el refrigerador.

Noche: beba por lo menos 16 onzas de líquidos claros adicionales durante la noche. Le animamos a que beba más líquidos para mantenerse bien hidratado.

La diarrea generalmente comienza entre 1 y 3 horas después de comenzar a beber el líquido y puede durar hasta 3 horas, pero luego debe detenerse.

Mañana del procedimiento:

Importante: Si no se toma la segunda dosis puede forzar la cancelación.

4 (cuatro) horas antes de su colonoscopia, beba cuatro vasos de 8 onzas de la preparación, un vaso cada 15 minutos. Beba por lo menos 16 onzas de líquidos claros adicionales de su elección. Cuando termine las 16 onzas de líquido adicional, detenga todos los líquidos

Si usted está teniendo un procedimiento doble (endoscopia superior y colonoscopia al mismo tiempo) beba la segunda dosis de PrEP 7 (siete) horas antes del procedimiento.

No beba nada 3 horas antes de su procedimiento (6 horas para el procedimiento doble).

* Si usted está en un antihipertensivo/presión arterial m