ABILENE SURGERY CENTER, LLC
Instrucciones preoperatoria para la cirugía de la retina

Por favor, siga estas instrucciones cuidadosamente.

1. Si usted tiene la cirugía antes del mediodía **NO COMA** ni **BEBA NADA** (incluyendo goma de mascar y caramelos) **después de la medianoche antes de la cirugía**. Si usted tiene la cirugía después de 3:00pm **NO COMA/BEBA** después de 7:00am.
2. Puede tomar líquidos claros hasta 7 horas antes de la cirugía.
3. Tome solo la mitad de la dosis normal de insulina en la mañana de su cirugía si usted normalmente toma insulina en la mañana.
4. Tome todos los medicamentos con un pequeño sorbo de agua. Los diuréticos de la mañana de la operación, es decir, Lasix, Furosemida, Aldactona, HCTZ. Medicamentos para diabéticos si se toman por vía oral. **Traiga los medicamentos el día del procedimiento.**
5. No tome aspirina, ibuprofeno o Aleve 7-14 días antes de la cirugía. **USTED DEBE CONSULTAR CON SU MEDICO DE ATENCION PRIMARIA/ CIRUJANO ANTES DE SUSPENDERLA ASPIRINA.**
6. Paciente tomando Coumadin or Plavix? **ES NECESARIO CONSULTAR CON SU MEDICO DE CABECERA ANTES DE PARADA COUMADIN.**
7. Lavarse la cara con un jabón antibacteriano suave (es decir Dial) la mañana de la cirugía. **No use ningún tipo de maquillaje para la cirugía incluyendo rímel. No use joyas o llevar objetos de valor con usted en el momento de la cirugía.**
8. Laboratorios deben realizarse 1 o 2 semanas antes de la cirugía (no antes de 14 días antes de la cirugía) a menos que se indique lo contrario.
9. Usted tendrá que tener un adulto que traiga, así como a llevar a casa el mismo día de la cirugía. También debe tener a alguien que se quede con usted por lo menos 12 a 24 horas después de la intervención con anestesia general o sedación IV.
10. Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a (325) 690-4466