

О Б Р А Щ Е Н И Е

COVID-19 представляет крайне высокий риск неблагоприятных исходов для 3 миллионов людей, живущих на диализе во всем мире. Диализные пациенты не могут соблюдать режим самоизоляции из-за необходимости продолжать жизненнообеспечивающее лечение в центрах диализа. Это означает, что получающие лечение диализом пациенты должны 3 раза в неделю приезжать в диализные центры и проводить там по 3-4 часа. В результате риск инфицирования COVID-19 для них в 20 раз выше, а риск смерти в 430 раз выше, чем для общей популяции. Поэтому приоритетная вакцинация диализных пациентов – это единственный способ обеспечить выживаемость для этой группы больных.

В некоторых странах, таких как Италия, Великобритания, Румыния, Ливан и Уругвай были введены в действие Национальные программы приоритетной вакцинации для пациентов на диализе, и успех этих программ уже очевиден. В связи с этим Международное общество нефрологов недавно обратилось к Всемирной организации здравоохранения с просьбой поддержать инициативу включения приоритетной вакцинации пациентов на диализе в Национальные планы вакцинации, и призвать организаторов здравоохранения во всем мире к немедленным действиям в этом направлении.

10 марта 2021 года три крупнейших международных нефрологических сообщества – Международное общество нефрологов, Европейская почечная ассоциация-Европейская ассоциация диализа и трансплантации, и Американское общество нефрологов выпустили совместное обращение.

В этом обращении президенты трех международных сообществ призывают к правительствам всех стран мира к немедленной приоритетной вакцинации людей, живущих на диализе. В обращении также отмечается, что многие диализные пациенты по тяжести состояния не могут самостоятельно приехать в центры проведения вакцинации, что создает необходимость осуществления вакцинации непосредственно в диализных центрах. Далее в обращении подчеркивается, что вакцинация именно диализных пациентов может внести наиболее весомый вклад по сравнению другими группами населения, и снизить инфицирование, смертность, и нагрузку на систему здравоохранения в целом. Пациенты на диализе, также как и медицинские работники, оказывающие им помощь, нуждаются в срочной вакцинации. И, поскольку сотрудники диализных центров обладают достаточным опытом в отношении вакцинации против сезонного гриппа и других инфекций, они смогут обеспечить консультирование пациентов и проведение вакцинации в максимально безопасном режиме.

Международные нефрологические сообщества выступают за немедленное обеспечение диализных пациентов и персонала диализных центров вакцинами против COVID-19 – это позволит спасти множество жизней и улучшить состояние здоровья людей во всем мире.

Российское диализное общество, Научное общество нефрологов России, Ассоциация нефрологов, Столичная ассоциация врачей-нефрологов и Ассоциация медицинских организаций по нефрологии и диализу (АМОНД) полностью поддерживают эту инициативу и призывают органы здравоохранения включить пациентов на диализе в программу приоритетной вакцинации, наряду с лицами старшего возраста, медицинскими работниками и представителями других социально–значимых профессий. Вопрос о необходимости приоритетной вакцинации пациентов на диализе рассмотрен на Совместном круглом столе МООНП «НЕФРО-ЛИГА» и Президиума ПК по нефрологии: «Последствия пандемии COVID-19 для нефрологических пациентов» 02.03.2021. Отмечено, вакцинация пациентов на диализе идет крайне медленными темпами. Вместе с тем, участники круглого стола констатировали, что на основании Российских данных, вакцинация диализных пациентов может внести наиболее весомый вклад в снижение инфицирования, смертности и нагрузки на систему здравоохранения в регионах. Врачам, осматривающих пациентов перед вакцинацией и принимающих решение о вакцинации на основе оценки соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации, рекомендовано рассматривать пребывание на диализе как приоритетное показание к вакцинации. С учетом того, что на программном диализе немало мультиморбидных и маломобильных пациентов, и тяжести состояния они не могут самостоятельно приехать в прививочные пункты для проведения вакцинации, органам управления здравоохранением на местах необходимо организовать выездную вакцинацию непосредственно в амбулаторных диализных центрах, совместно с медицинскими организациями, оказывающих специализированную помощь по диализу. Мы также призываем диализных пациентов ответственно и активно отнестись к вакцинации против COVID-19 и не отказываться от проведения прививок.

Председатель РДО	Е. В. Захарова
Президент НОНР	И. Н. Бобкова
Председатель Столичной ассоциации нефрологов	О. Н. Котенко
Президент Ассоциации нефрологов	А. В. Ватазин
Председатель наблюдательного совета «АМОНД»	В. Ю. Шило
Председатель ПК по нефрологии ЭС МЗ РФ, гл. специалист по нефрологии	Е. М. Шилов

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации
Главный специалист нефролог

119991, г. Москва, улица Россолимо, дом 11, строение 4, тел./факс: (499)-248-4166, email: emshilov@mma.ru

05.04.2021/НС-27

**Министру здравоохранения
Российской Федерации
М.А. Мурашко**

Глубокоуважаемый Михаил Альбертович!

От имени Президиума профильной комиссии по нефрологии Экспертного совета Минздрава России прошу Вас поддержать обращение руководителей общественных профессиональных организаций врачей-нефрологов о первоочередной обязательной вакцинации от COVID-19 больных, получающих заместительную почечную терапию (ЗПТ) – гемодиализ, перитонеальный диализ, имеющих почечный аллотрансплантат.

Обращение продиктовано Заявлением международных нефрологических организаций (ISN, ASN, ERA/EDTA), призывающим правительства государств всего мира к первоочередной вакцинации больных на ЗПТ, являющихся по эпидемиологическим данным группой наивысшего риска заболеваемости и смертности от COVID-19, опережающей по этим показателям больных с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.


Общероссийское эпидемиологическое исследование больных на ЗПТ за 2020 год показало превышение заболеваемости этих больных над общероссийской популяцией в 7 раз, смертности – в 15 раз (от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, соответственно, в 10 и 12 раз). Таким образом, обязательная вакцинация является жизненноспасающей для этой тяжелой популяции больных, одновременно предотвращая дальнейшее распространение инфекции.

В связи с выше сказанным Вас направить соответствующие указания органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации.

Приложение:

1. Обращение руководителей общественных профессиональных организаций врачей-нефрологов – на 2 л.
2. Результаты эпидемиологического исследования больных на ЗПТ – на 8 л.

Главный внештатный специалист
нефролог



Е.М. Шилов